

Ministère de l'Agriculture Service de la Protection des Végétaux Chemin d'Artigues - 33150 CENON

Dordogne-Gironde-Landes-Lot&Garonne-Pyrénées Atlantiques

Abonnement annuel: 100 F, 00

BULLETIN TECHNIQUE Nº 35 - Mercredi 19 Octobre

deshir de fendement dell aussi comendant

GRAMDES CULTURES

CEREALES D'HIVER

LE DESHERBAGE DE PRELEVEE

Ces préconisations ont été mises au point conjointement par l'I.T.C.F. (Dordogne-Gironde) et le Service de la Protection des Végétaux (Aquitaine).

Le désherbage en prélevée s'impose dans les situations où le type de sol interdit tout passage dans la parcelle après la levée de la culture, et ce jusqu'à la fin de l'hiver (mattes non inondables, boulbènes drainées, argile du Bec d'Ambès...), voire jusqu'au stade 2 noeuds, stade limite au delà duquel les spécialités herbicides actuelles peuvent provoquer des malformations d'épis, (mattes inondables, palus, sols du Périgord vert, sols des vallées de l'Isle et de la Dordogne, fonds de vallées de l'Issigeacois et du Canton d'Eymet, boulbènes non drainées ...).

Le desherbage de prélevée est en outre une bonne solution technique en cas de précédent salissant libérant tôt le sol (colza, céréale, prairie temporaire, luzerne) ; il permet alors de lutter contre les graminées dans les meilleurs conditions possibles (l'herbicide a une action plus efficace et plus régulière qu'en post-levée), s'insère assez bien dans le programme de mise en culture et offre plus de garanties de non-phytotoxicité.

Le desherbage est coûteux. Les conditions nécessaires à sa rentabilisation sont :

- Réaliser l'application sur sol humide ressuyé, finement préparé (seuls le Glean T et le Trilixon "tolèrent" des sols motteux), sur semis régulier et bien recouvert :
- Respecter les indications portées sur l'étiquette de l'emballage du produit (en particulier concernant les diminutions de doses en sols légers).
- Pulvériser le produit dans les conditions optimales (rampe la plus horizontale possible et ne portant qu'un seul type de buse - préférer les buses à jet plat - avancer à une vitesse de 6 à 8 km/h - vérifier que la pression n'excède pas 2 bars).
- Choisir l'herbicide le mieux adapté ; le tableau ci-joint permet de guider ce choix, en examinant les critères suivants :

Imprimerie de la Station de BORDEAUX Directeur-Gérant : A. GRAVAUD

524 AD

-2.

Leaned S aso

- rémanence minimale acceptable (limitations de passage en post-levée par l'excés d'eau);

- choix du spectre d'action sur graminées en fonction des infestations habituellement constatées ;
- choix des spécialités compatibles avec l'espèce cultivée (blé tendre d'hiver (b), orge (o), avoine (a), seigle(s), triticale (t);
 - choix du spectre d'action sur dicotylédones.

L'objectif de rendement doit aussi capendant intervenir au niveau du coût du produit.

Signalons enfin que les spécialités contenant du chlortoluron sont déconseillées sur les variétés Aboukir, Albatros, Arminda, Carat, Fidel, Gala, Prinqual, Talent, Tango.

/ COLZA /

De fortes infestations de larves de tenthrède de la rave ont pu être notées dans la région. Ces larves brunes ou noirâtres qui ne sont pas des chenilles, ressemblent à de petits vers gris (0,5 à 2 cm) sont très dommageables aux jeunes cultures et peuvent efficacement être combattues par une application de cyperméthrine à 25 g MA/ha, deltaméthrine à 7,5 g MA/ha, fenvalérate à 50 g MA/ha, parathion à 350 g MA/ha en pulvérisation, 600 g MA/ha en poudrage, phosalone à 1200 g MA/ha.

LIMACES /

A la suite de la période pluvieuse actuelle, nous rappelons qu'il est indispensable de rester vigilant, notamment dans les jeunes cultures (colza, céréales). Voir bulletin n° 32 du 5 septembre dernier.

GRAMINEES FOURRAGERES ET GAZOMS

7

The second second

/NOCTUELLE DES GRAMINEES /

Comme prévu (notre bulletin nº 33 du 21.9.83) les toutes premières attaques de chenilles de Cirphis unipuncta sont observées depuis quelques jours dans des prairies de graminées du Tursan (populations allant de 10 à 25 chenilles au m2) tandis que le vol des papillons se poursuit activement en Tursan, Chalosse, Seignanx, et dans les zones habituelles du Léarn et du Pays Basque.

besignments possible of me norther golds sent type or trace - profirer les buses i

jet plat - avancer à une viresse de 6 à 8 km/h - veriffer que la proseion n'exoède

Dans ces régions une surveillance soigneuse des prairies de graminées et des gazons est recommandée. En cas d'infestation, contacter les antennes du Service de la Protection des Végétaux de DAX (Tél.58/74.11.93) ou PAU (tél. 59/02.79.33).

Thirty lear is produit come the conditions of the first the first party of

E choisir l'herhielde le mious adapte ; le tableau ci-joint permet de

ser instractions portion for Dariquette de L'emaaltage de

SUMME

DESHERBAGE DE PRE-LEVEE DES CEREALES D'HIVER

Cicotylédones	Stellaire Gaillet Véro- O'éro- O'applica- nique cation	+ + Pré-levée	+ + Pé:1evée	Pré-sem	Semis ou	+ + Pré-levée	+ + +
Cicotyledo	Phalani	+	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +			+	
	Pâtorin	nograne SP b	ixan N (b	dex BW(b,o	52	di x (b, o, s, t	1 x 1 + 1"
	Agrost	Dinogra	Perixan	Avadex**	10k H	- Prodix	Prodi x Herbal t Tolion 3
+	Ray-						
	sitsongA						
•	ninut£9						T N N
Graminées	n iqi uV		F			1	
Gram	B rome.	+					
	s insladq	71				1	112
	Folles avoines d'automne				J.		
	Rémanence moyenne des produits		<u> </u>				

(Pré-levée = post-semis, pré-levée)

orquibe laineitens nu efficación Ond vebs (Suite du tableau au verso) colherav nus elem E ple sonegramen enulup de nu tableau au verso) acinerav nus elem E ple sonegramen enulup de nu tableau esta la la columne elemente elemente nomuden el la columne elemente elemente.

STEINSBAM 3R

. Les Avadex BY 81 BWG, 1/Escuran,


teur épandage.

te Chandor

0

Bulletin technique n° 35 du 19 Octobre 1983

P554



REMARQUES

Les Avadex

BW et BWG,

l'Escuran, épandage.

le Chandor,

mmédiatement après leur

L'application de l'Avadex BWG nécessite un matériel

néburon formulé seul n'est pas actif sur pâturin

n'ont qu'une rémanence de

3 mois sur véronique

adapté

commun (vivace), mais

seulement sur pâturin

es produits*

annuel